



V Congresso Nazionale Slow medicine

Slow medicine: la salute come sistema

Firenze, 7 febbraio 2020

Modulo abstract

Inviare via e-mail entro il 15 gennaio all'indirizzo:

eventi@newaurameeting.it

	Programma di scrittura Word Carattere Times New Roman. Dimensione carattere 12. Interlinea singola. Allineamento: giustificato. Per riferimenti bibliografici (max 3) tipo: Barter PJ, et al. Titolo. Sigla rivista anno; vol: pag-pag.
Titolo dell'abstract (in grassetto)	DEPRESCRIZIONE PER UN USO APPROPRIATO E CONSAPEVOLE DEGLI ANTIBIOTICI
Sessione del convegno	<input type="checkbox"/> La salute in un mondo che cambia <input type="checkbox"/> Amici microbi <input checked="" type="checkbox"/> Deprescrizione
Autore/i (cognome e iniziale del nome puntato tipo: Rossi A., Bianchi B.)	Azzan E., Dairaghi M., Funes M., Poggi L.,
Ente/i di appartenenza (in corsivo)	<i>Azienda Sanitaria Locale Novara</i>
E-mail	mariangela.dairaghi@asl.novara.it

<p>Abstract (max 1500 caratteri, spazi inclusi)</p>	<p>INTRODUZIONE Uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici aumentano il fenomeno di resistenza, mortalità, degenze ospedaliere prolungate e costi sanitari. OBIETTIVO Individuare azioni per migliorare appropriatezza degli antibiotici, promuovendo confronto tra pari ed educare i pazienti ad un uso consapevole. MATERIALI E METODI Promozione di audit formativi sul trattamento di patologie delle vie respiratorie e urinarie per Pediatri e Medici di Medicina generale, previa consultazione di letteratura recente, diffusione delle azioni individuate tramite eventi formativi e opuscoli per i pazienti. L'efficacia degli interventi è stata monitorata valutando l'andamento prescrizioni SSR delle classi di antibiotici maggiormente prescritte a pazienti pediatrici e adulti. RISULTATI Nel 2016 sono state prescritte dai Pediatri 28.173 confezioni (63% penicilline, 20% cefalosporine, 15% macrolidi e 12 confezioni di chinoloni controindicati nei pazienti pediatrici); nel 2017 si è registrata una diminuzione complessiva del -16%, e nessuna prescrizione di chinoloni. Il focus su amoxicillina e amoxicillina clavulanato, associazione non di prima scelta in molte linee guida, ha evidenziato un aumento di amoxicillina dal 11% al 21%. Ai medici delle Equipe territoriale sono stati inviati periodicamente report sulla prescrizione di antibiotici per un confronto tra pari; nel 2018 sono state prescritte 3.535.438 confezioni (34% penicilline, 24% cefalosporine, 14% macrolidi e 20% confezioni di chinoloni). Nel 2019 si è registrata una diminuzione complessiva del -5,5% e del -32,2% chinoloni gravati da reazioni avverse in pazienti anziani. CONCLUSIONI Il monitoraggio effettuato ha dimostrato che le azioni messe in atto sono state efficaci, diminuendo le prescrizioni inappropriate.</p>
--	---